

SUPERIUM

ВОРМТАЛ

СУПЕРІУМ Вормтал

антигельмінтні таблетки

для собак та цуценят (таблетки)

листівка-вкладка

Опис

Таблетки круглої форми із хрестоподібною насічкою з одного боку, від світло-жовтого до жовтого кольору зі специфічним запахом.

Склад

Одна таблетка (0,5 г) містить діючі речовини (мг):
пірантелу памоат – 150;
празіквантел – 50;
фебантел – 150.

Допоміжні речовини: стеарат кальцію, лактоза.

Дозування

Рекомендована доза – 1 таблетка (0,5 г) на 10 кг тіла тварини та 1 таблетка (1,5 г) на 30 кг тіла тварини.
Препарат задають тваринам індивідуально одноразово з невеликою кількістю корму у подрібненому вигляді або примусово на корінь язика у дозах:

	Маса тіла тварини, кг	Вага таблетки, г	Кількість таблеток, табл.	Пірантелу памоат, мг	Празіквантел, мг	Фебантел, мг
Для цуценят та середніх порід собак	1-5	0,5	1/2	75,0	25,0	75,0
	5-10		1	150,0	50,0	150,0
	10-15		1+½	225,0	75,0	225,0
	15-20		2	300,0	100,0	300,0
Для середніх та крупних порід собак	30-45	1,5	1	450,0	150,0	450,0
	45-60		1+½	675,0	225,0	675,0
	>60		2	900,0	300,0	900,0

Профілактичну дегельмінтизацію проводять один раз у квартал.
Тривалість лікування: одноразово. При необхідності повторити через 2 тижні.
Дослідження фекалій рекомендується проводити через 1–3 місяці, як альтернативу для повторного лікування.
Лікування гіардіозу (Giardia spp., sin. Lamblia spp.):
рекомендована доза – 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини, застосовують впродовж 3 діб.

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При передозуванні препаратом у деяких тварин можуть спостерігатися пригнічений стан, слинотеча, парез м'язів, тремтіння і (або) хитка хода. Ці симптоми проходять спонтанно протягом доби, при необхідності тварині призначають засоби симптоматичної терапії.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату!
Не застосовувати виснаженим та хворим на інфекційні захворювання тваринам!
Не застосовувати самкам в першій половині вагітності!
Не застосовувати цуценятam віком до 3 тижнів!
Не застосовувати собакам масою тіла до 1 кг.

Застереження

Не застосовувати одночасно з піперазином і препаратами, які інгібують холінестеразу.

Форма випуску

Таблетки запаковані по 2 шт. у блістери з фольги ОПА/АІ/ПВХ холодного штампування.
Блістери упаковані в картонну коробку. Для тварин різної маси тіла випускають таблетки по:
0,5 г – для цуценят та середніх порід собак;
1,5 г – для середніх та крупних порід собак.

Зберігання

Зберігають препарат у сухому темному місці, окремо від продуктів харчування та кормів, у недоступному для дітей і тварин місці, за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

РП: АВ-09955-01-26

Лише для ветеринарної медицини!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення: ТОВ «КОЛЛАР КОМПАНІ», 14000, м. Чернівці, вул. Гетьмана Полуботка, 7, Україна.

Назва та місцезнаходження виробника готового продукту: ТОВ «ІНТЕР ЛЕК», 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1, Україна.

Рекламації приймає:
ТОВ «КОЛАР КОМПАНІ» +38 067 464-43-03 (viber).

Консультація ветеринара:
0 800 300-995 (безкоштовно)
+38 067 553-36-63 (viber/telegram)

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52A, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AF02 пірантелу памоат; QP52AA01 празіквантел; QP52AC05, фебантел).

Препарат належить до комбінованих антигельмінтних препаратів. Комбінація празіквантелу, пірантелу памоату та фебантелу забезпечує широкий спектр антигельмінтної дії щодо нематод у собак (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis), цестод (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Joyeuxiella pasqualei, Taenia spp., Mesocostoides spp.) та паразитичних найпростіших (Giardia spp.). Комбінація діючих речовин пірантелу та фебантелу, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (аскарид, анкілостом, унцинарій, волосоголовців).

Пірантелу памоат – похідний тетрагідропримідину, діє як холінергічний антагоніст, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполяризуючої нервово-м'язової блокади. Пірантелу памоат, що абсорбувався до системи кровообігу, частково метаболізується в печінці до N-метил-1,3-пропандіаміна. Половина дози (50%) пірантелу памоату виводиться з організму у незміненому вигляді з калом, близько 7% – з сечею у незміненому стані або у вигляді метаболітів. Пірантелу памоат добре переноситься більшістю собак. Щоденне застосування 20 мг/кг протягом 3 місяців не було пов'язане з будь-якими побічними ефектами.

Празіквантел є похідним піразин-ізохіноліну, володіє вираженою дією проти цестод. Підвищуючи проникність клітинних мембран паразита для іонів кальцію, спричиняє деполяризацію мембран, скорочення мускулатури і руйнування тегументу, що призводить до загибелі паразита і сприяє його виведенню з організму тварини. Максимальна концентрація празіквантелу у плазмі крові досягається через 1 годину. З організму сполука виводиться в основному у вигляді неактивних метаболітів із сечею, період напіввиведення складає біля 3 годин після перорального введення препарату. Діюча речовина препарату, фебантел – нематододид, який порушує вуглеводневий обмін у паразитичних червів. Він пригнічує мітохондріальні реакції шляхом пригнічення фумаратредуктази та перешкоджає транспорту глюкози. Він метаболізується до сполуки бензімідазолу, яка зв'язується зі структурним білком тубуліном і запобігає полімеризації до мікротрубочок, що призводить до неповного травлення та поглинання поживних речовин паразитом. У результаті структурних та метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого настає їх загибель на 2 - 3 добу. Фебантел можна призначати вагітним самкам та тваринам під час лактації для профілактики та лікування личинок і дорослих стадій нематод травного каналу. Фебантел активний проти деяких видів збудників протозойних захворювань (Giardia spp.), що описано в літературних джерелах.

Застосування

Лікувально-профілактична дегельмінтизація собак та цуценят за ураження:

- нематодами травного каналу – Toxocara canis, Toxascaris leonina (личинкові, молоді та статевозрілі стадії), Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (молоді та статевозрілі стадії), Trichuris vulpis (молоді та статевозрілі стадії), Strongyloides stercoralis;
 - цестодами (преімагінальні та імагінальні стадії) – Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus granulosus, Alveococcus multilocularis, Mesocostoides spp.
- Лікування протозойних захворювань цуценят та собак, викликаних Giardia spp.