

SUPERIUM PANACEA

СУПЕРІУМ Панацея

протипаразитарні краплі на холку для собак

(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)

листівка–вкладка

Опис

Прозорий розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини: імідаклоприд – 120 мг, моксидектин – 30 мг.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт, N-метилпіролідон, каприловий тригліцерид, ПЕГ-400.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP54. ендектокцини (QP54AB52, моксидектин, комбінації).

Фармакодинаміка

СУПЕРІУМ Панацея протипаразитарні краплі на холку для собак – це ендоектопаразитицид місцевого застосування. Фармакологічні властивості препарату обумовлені властивостями діючих речовин.

Моксидектин належить до другого покоління макроциклічних лактонів групи мільбеміцинів. Діє проти багатьох ендо- та ектопаразитів. Моксидектин активний проти личинок, молодих та статевозрілих нематод та личинок мікрофілярій (стадії L3, L4) *Dirofilaria* spp.. Моксидектин взаємодіє з гамма-аміномасляною кислотою та з глютаровими хлорними каналцями паразитів, що призводить до відкриття хлорних каналців у постсинаптичному просторі. Збільшення кількості іонів хлору призводить до незворотнього зниження м'язової активності, паралічу та загибелі паразитів.

Імідаклоприд належить до групи хлорнікотинілових сполук. Приєднуючись до нікотинергічного рецептора ектопаразита, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу та спричиняє його загибель. Імідаклоприд має низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому не впливає на центральну нервову систему ссавців.

Фармакокінетика

Моксидектин всмоктується через шкіру, досягаючи максимальної концентрації у плазмі крові від 4 до 9 доби після обробки тварини і повільно виділяється з плазми упродовж одного місяця.

Після нанесення препарату, імідаклоприд швидко поширюється по поверхні шкіри тварини, накопичується в епідермісі, волосяних фолікулах і жирових залозах, що сприяє його довготривалій контактній інсектоакарицидній дії.

Застосування

Препарат призначають дорослим собакам та цуценятам для профілактики і лікування при ураженні:

- ендопаразитами: нематодами (личинкові, молоді та статевозрілі стадії) (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Angiostrongylus vasorum*, *Crenosoma vulpis*);
- ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides* spp., *Pulex irritans*), вошами (*Linognathus setosus*), волосоїдами (*Trichodectes canis*); саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Sarcoptes canis*); тромбідіформними кліщами (*Demodex canis*, *Cheyletiella jaszguri*).
- Профілактика та лікування алергічного блошиного дерматиту (flea allergy dermatitis: FAD).
- Профілактика дирофіляріозу: *Dirofilaria* spp. (мікрофілярії L3 та L4 стадій).

Дозування

Препарат застосовують зовнішньо шляхом одноразового нанесення на суху непошкоджену шкіру в місцях, що недоступні для злизування (ділянка холки та вздовж хребта).

Залежно від маси тіла тварини препарат застосовують різного фасування:

Маса тіла собаки	Туба	Імідаклоприд	Моксидектин
для малих собак (від 1 до 4 кг)	0,5 мл	60 мг	15 мг
для середніх собак (від 4 до 10 кг)	1,0 мл	120 мг	30 мг
для великих собак (від 10 до 20 кг)	2,0 мл	240 мг	60 мг
для дуже великих собак (від 20 до 30 кг)	3,0 мл	360 мг	90 мг
для дуже великих собак (понад 30 кг)	відповідна комбінація туб		

1. Лікування та профілактика токсокарозу, токскаррозу, анкілостомозу, унцинаріозу, трихорозу – препарат застосовують щомісяця.

2. Лікування ангіостронгілозу – одноразова доза. При необхідності за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини можлива повторна обробка через 30 днів.

3. Лікування кренозомозу – одноразова обробка.

4. Профілактика дирофіляріозу – обробку тварин препаратом розпочинають за один місяць до нападу комарів і припиняють через 1 місяць після його закінчення. Для захисту тварин від нападу кровосисних комах використовують інсектициди та репеленти.

5. Лікування та профілактика сифонаптерозу, алергічного блошиного дерматиту – препарат застосовують щомісяця. Одноразова обробка препаратом захищає тварин від ураження блохами впродовж 4-х тижнів.

6. Лікування отодектозу – одноразова обробка, за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини повторна обробка через 30 днів. Важливо не наносити безпосередньо у вушний прохід.

7. Лікування ліногнатошу, триходектозу, саркоптозу, хейлетіозу – тварин обробляють препаратом двічі з інтервалом 30 днів.

8. Лікування демодекозу – препарат застосовують один раз на 30 днів впродовж 2-4 місяців. В усіх випадках лікування тварин проводять до тих пір, поки результати 2 послідовних щомісячних лабораторних досліджень будуть негативними (зішкроби зі шкіри). Оскільки демодекоз у собак часто ускладнюється піддермією, дерматомікозами необхідно проводити комплексне лікування, спрямоване на нормалізацію функції шкіри, гормонального статусу, поліпшення росту шерсті, посилення імунних реакцій.

Метод застосування:

Собак обробляють у стоячому положенні. Перед обробкою вийняти тубу з упакування та, тримаючи вертикально, відкрити кришку на тубі. Розділити шерсть тварини і видавити весь вміст безпосередньо на шкіру, починаючи між лопатками та вздовж хребта.

При нанесенні препарату уникати потрапляння препарату в очі та в роту порожнину тварини. Для запобігання злизування препарату собаці надягають намордник або комір.

Побічна дія

Іноді у тварин, у місцях нанесення препарату, спостерігають короточасний свербіж, еритеми на шкірі, ознаки засалювання шерсті, які швидко проходять.

При злизуванні препарату твариною після обробки можуть виникати такі побічні явища: гіперсалівація, блювання та ознаки нервових розладів.

При виникненні ознак побічної дії препарат змити водою із шампунем і за порадою лікаря ветеринарної медицини застосувати альтернативний препарат.

Протипоказання

Не застосовувати цуценятам віком до 7 тижнів і/або масою тіла до 1 кг.

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складових препарату.

Не застосовувати виснаженим та хворим тваринам.

Не застосовувати одночасно з іншими протипаразитарними препаратами.

Застереження

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. Так як препарат містить моксидектин (макроциклічний лактон), тому необхідно з обережністю обробляти собак таких порід як коллі, велика англійська вівчарка та порід близьких до них. Обробку тварин препаратом під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини. Застосовувати виключно за призначенням. Не вживати всередину. Не зберігати разом з продуктами харчування. При обробці тварин уникати потрапляння препарату в очі, роту порожнину. Не допускати контакту щойно обробленої тварини з іншими тваринами. При випадковому потрапленні препарату на шкіру, слизові оболонки або очі необхідно ретельно промити їх проточною водою. Власники тварин із гіперчутливістю до складників препарату обробку тварин повинні проводити у гумових рукавицях. Після закінчення роботи з препаратом вимити руки теплою водою з милом. Під час обробки тварин препаратом не палити, не пити, не приймати їжу. Після обробки тварин препаратом не допускати їх до маленьких дітей впродовж 24 годин. Собак не слід купати та не дозволяти їм плавати у відкритих водоймах протягом 2 днів перед та після обробки.

Форма випуску

Полімерні туби по: 0,5 мл – для малих собак масою тіла 1 – 4 кг; 1,0 мл – для середніх собак масою тіла 4 – 10 кг; 2,0 мл – для великих собак масою тіла 10 – 20 кг; 3,0 мл – для дуже великих собак масою тіла 20 – 30 кг, запаковані в картонні коробки по одній штуці.

Зберігання

Зберігати препарат у закритому упакуванні виробника, у сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів при температурі від 0 до 30 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

РП: АВ-05886-03-15

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «КОЛЛАР КОМПАНІ», 14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, б. 7, Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ «ІНТЕР ЛЕК», 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, б. 1, Україна

Рекламації приймає: ТОВ «КОЛЛАР КОМПАНІ» +38 067 464 43 03 (viber)

Консультація ветеринара - 0 800 300 995 (безкоштовно)

+38 067 553 3663 (viber/telegram)